Wiederbelebung bei Säuglingen

Keine Reaktion?

↓

Um Hilfe rufen

↓

Atemwege freimachen

↓

Keine normale Atmung?

↓

5 Beatmungen

↓

Keine Lebenszeichen?

↓

30 Thoraxkompressionen
2 Beatmungen

Sehen Sie unser Trainingsvideo zur Wiederbelebung bei Kindern: www.kindernotfall-bonn.de

ukb universitäts klinikum bonn

Neonatologie/Pädiatrische Intensivmedizin
www.neonatologie-bonn.de

Schützen Sie Ihr Baby!
Sorgen Sie für einen sicheren Schlaf.

Immer auf dem Rücken und im Babyschlafsack!
Diese Maßnahme allein vermindert das Risiko des plötzlichen Säuglingstodes um mehr als 50 Prozent!

Kein Kopfkissen. Keine Decke.
Kopfkissen, Bettdecken, Nestchen und Stofftiere können die Atemwege Ihres Kindes verlegen und gehören nicht in ein Babybett!

Im eigenen Babybett. Im Elternschlafzimmer.
Säuglinge sollten im elterlichen Schlafzimmer, aber im eigenen Bett schlafen.

Überwärmung vermeiden.
Vermeiden Sie eine Überwärmung Ihres Kindes (Schlafzimmer nicht über 18 °C heizen, keine Mütze innerhalb des Hauses, Gitterbett, feste luftdurchlässige Matratze).

Gestillte Kinder schlafen sicherer!

Rauchen Sie nicht!

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kindernotfall-bonn.de/elterninfo

ukb universitätsklinikumbonn

Neonatologie/Pädiatrische Intensivmedizin
www.neonatologie-bonn.de

MZ01444_Stand_2021-11-29